


شکستگی استخوان گونه شایعترین شکستگی ناحیه صورت است که به دلیل محل و برجسته بودن این استخوان روی صورت و همچنین نازک بودن نسبی ناحیه قوس گونه است. شایع ترین دلیل شکستگی گونه نزاع و درگیری های فیزیکی و تصادفات رانندگی است.



علائم شکستگی گونه:

کبودی زیر چشم، خونریزی در ناحیه سفیدی چشم، عدم تقارن در سمت صورت که در روزهای اولیه پس از آسیب به دلیل تورم ناحیه و پس از چند روز ناشی از فرورفتگی استخوان گونه در سمت آسیب دیده میباشد، عدم توانایی در باز کردن کامل دهان و محدودیت در حرکات فکی، بی حسی لب بالا و گونه و پره بینی و لثه و دندان های جلویی فک بالا در سمت آسیب دیده، دوبینی، گرفتگی بینی و خونریزی از بینی و در موارد شکستگی های شدید عدم جفت شدن کامل و دقیق دندان های فک بالا و پایین روی هم از علائم شکستگی های گونه میباشد.

در صورت مشاهده این علائم در بیماری که سابقه ضربه به ناحیه فک و صورت خود داشته و تک به شکستگی گونه رادیوگرافی ها و اسکن های صورت درخواست شده و پس از تشخیص قلعی شکستگی بهار جهت درمان ارجاع میگردد.


روش های درمان

درمان شکستگی های گونه بر اساس نوع و محل شکستگی، سن بیمار، میزان جابه جایی قطعات شکسته و... متفاوت میباشد.

-در موارد خفیف این شکستگی ها که قطعات شکسته جا به جایی زیادی نداشته و بیمار علائم شدیدی نداشته باشد، درمان جراحی ضروری نبوده و پیش از تجویز دارو های مسکن و آنتی بیوتیک و توصیه جهت جلوگیری از وارد شدن فشار زیاد به ناحیه شکسته، بیمار ترخیص شده و در فواصل زمانی مشخص جهت ویزیت مجدداً مراجعه میکند.

-در صورت وجود شکستگی با جا به جایی زیاد و وجود علائم شدید مانند درد، تورم، ایجاد مشکل زیبایی در ظاهر بیمار و بی حسی لب و... بیمار نیازمند مداخله جراحی است. جراحی های فک و صورت جهت درمان شکستگی های گونه به دو صورت عمده شامل جا اندازی قطعات شکسته در موقعیت مناسب و یا به صورت محکم کردن قطعات شکسته با استفاده از پیچ و ابزارهای فلزی میباشد.

-درمان جراحی شکستگی های گونه در اغلب موارد نیازمند بر پوستی در کنار و زیر چشم و کناره ی ابرو میباشد. با این که اگر این برش ها در پوست ماندگار است ولی با توجه به قرارگیری برش ها در چین و چروک طبیعی پوست، مشکل زیبایی چندانی برای بیمار ایجاد نخواهد شد.



مراقبت های قبل از عمل:

-رعایت بهداشت دهان با استفاده از مسواک و خمیر دندان و دهانشویه.

-مصرف آنتی بیوتیک و سایر داروهای تجویز شده توسط پزشک معالج

-اصلاح موهای صورت شامل ریش و سیل در آقایان

-ناشتا بودن حداقل از ۸ ساعت قبل از عمل در صورت نیاز به بیهوشی طبق نظر پزشک معالج

به نام خدا



وزارت بهداشتی درمانی
دانشگاه علوم پزشکی

دانشکده دندانپزشکی تبریز



مراقبت های بعد از عمل:


- مصرف غذا های نرم و آبکی با صلاحدید پزشک
- معالجه.
- رعایت بهداشت دهان با مسواک و خمیر دندان و دهانشویه

مراقبت های پس از ترخیص:

- مصرف دارو های تجویز شده طبق دستور پزشک
- معالجه.
- رعایت بهداشت دهان. مصرف غذا های نرم و آبکی با نظر پزشک معالج.
- پرهیز از انجام ورزش های سنگین و موقعیت های خطرناک که احتمال ضربه به گونه وجود دارد.
- استفاده از محافظ گونه طبق دستور پزشک معالج.
- پانسمان زخم ها طبق دستور پزشک معالج.
- مراجعه مجدد به پزشک معالج در زمان های تعیین شده.

ابزارهای فلزی که زیر پوست و مخاط دهان قرار دارند و قابل مشاهده نیستند تا زمانی که با سایر درمان ها تداخلی نداشته باشند، عفونی و یا قابل لمس نباشند و مشکلی برای بیمار ایجاد نکنند، در محل باقی می مانند.

در صورتی که بیمار دارای این ابزار های فلزی در فک و صورت خود میباشد، لازم است همیشه پزشک معالج خود را قبل از انجام هرگونه اقدام پزشکی شامل تصویربرداری و MRI از وجود این ابزار ها مطلع سازد.



شکستگی گونه بخش جراحی