

لازم به ذکر است که تورم صورت بلافاصله بعد از تخلیه آبسه به صورت کامل فروکش نخواهد کرد، فرایند بهبودی زمانبر بوده و مشروط به حذف عامل عفونت از طریق کشیدن دندان عفونی یا درمان ریشه آن دندان میباشد.

آبسه فکی به سادگی با رعایت بهداشت دهان و دندان، ویزیت های منظم دندانپزشکی و درمان دندان های پوسیده قابل پیشگیری است.



-انجام فیزیوتراپی جهت افزایش میزان باز کردن دهان طبق دستور پزشک معالج.



مراقبت های پس از ترخیص:

-مصرف دارو های تجویز شده طبق دستور پزشک معالج.

-رعایت بهداشت دهان با مسواک و خمیر دندان و دهانشویه.

-پانسمان زخم طبق دستور پزشک معالج.

-مراجعه به دندانپزشک جهت تکمیل درمان دندانپزشکی طبق نظر پزشک معالج.

-مراجعه مجدد به پزشک معالج در زمان های تعیین شده.

محل برش باید در طول روز چندین نوبت شستشو داده شود تا زمانی که تخلیه عفونت به صورت کامل انجام گیرد. علاوه بر تخلیه آبسه ضروری است برای بیمار آنتی بیوتیک تجویز شود. همچنین در بیماران مبتلا به بیماری های تضعیف کننده سیستم ایمنی لازم است جهت تقویت سیستم ایمنی نیز اقدام شود.

مراقبت های قبل از عمل:

-رعایت بهداشت دهان با استفاده از مسواک و خمیر دندان و دهانشویه.

-مصرف آنتی بیوتیک و سایر دارو های تجویز شده توسط پزشک معالج.

-اصلاح موهای صورت شامل ریش و سبیل در آقایان

-ناشتا بودن حداقل از ۸ ساعت قبل از عمل در صورت نیاز به بیهوشی طبق نظر پزشک معالج.

مراقبت های بعد از عمل:

-رعایت بهداشت دهان با مسواک و خمیر دندان و دهانشویه.

به نام خدا



دانشکده دندانپزشکی تبریز



آبسه فکی بخش جراحی


آبسه فکی میتواند به دلیل دندان پوسیده و درمان نشده، وجود دندان نیمه نهفته و عفونی شدن آن، التهاب لثه و گاهی به دنبال انجام درمان دندانپزشکی رخ دهد.

علائم آبسه

درد، تورم داخل دهانی با تورم صورت و گردن، تب، نا توانی در باز کردن کامل دهان، احساس وجود چرک در دهان، گلودرد و در موارد شدیدتر احساس تنگی نفس از علائم آبسه فکی می باشد.

آبسه فکی در کودکان و بیمارانی که شرایط پزشکی پیچیده ای دارند به سرعت پیشرفت کرده و در صورت عدم درمان میتواند منجر به عوارض غیر قابل جبران از جمله گسترش عفونت و درگیری ارگان های حیاتی گردد.

در صورت مشاهده این علائم و تشخیص علت دندانی آبسه رادیوگرافی های مناسب درخواست شده بیمار جهت درمان ارجاع می گردد.



روش های درمان

درمان قطعی آبسه فکی، درمان دندانپزشکی جهت حذف عامل عفونت است که به صورت کشیدن دندان با درمان ریشه میباشد ولی در موارد پیشرفته این بیماری، که بیمار تب دار و باحال بوده و گلودرد و تنگی نفس نیز دارد و نمیتواند دهان خود را به صورت کامل باز کند و نیز در بیمارانی که شرایط پزشکی پیچیده ای دارند، ضروری است بیمار در بیمارستان بستری شده و تحت نظر قرار گیرد و در صورت لزوم جهت تخلیه آبسه و کشیدن دندان عامل عفونت در اتاق عمل اقدام شود.

در صورت نیاز به تخلیه آبسه، غالباً تحت آرامبخشی و در شرایط استریل اتاق عمل از طریق برش پوستی یا داخل دهانی انجام میگردد.

